

УДК 616.12-008.313-036.8

Клинико-anamнестические факторы сохранения синусового ритма после успешной кардиоверсии фибрилляции предсердий у больных с коморбидной артериальной гипертензией и значение медикаментозной терапии
Мотылевкая Т. В.

Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Резюме. Обследовано 158 пациентов с артериальной гипертензией и персистирующей формой неклапанной фибрилляции предсердий. Проанализированы клинико-anamнестические данные, показатели эхокардиоскопического обследования, а также схемы антиаритмической и иной сопутствующей терапии у пациентов с персистирующей фибрилляцией предсердий, подвергшихся плановой электрической кардиоверсии.

Определены факторы, влияющие на длительное удержание синусового ритма, показатели, влияющие на рецидив фибрилляции предсердий. Установлено, что среди клинико-anamнестических факторов предиктором раннего рецидива фибрилляции предсердий после электрической кардиоверсии является факт наличия инсульта в анамнезе, а также длительность существования артериальной гипертензии.

Включение в комплексную антиаритмическую терапию, которая проводится перед электрической кардиоверсией, а также после восстановления синусового ритма, сартанов и антагонистов альдостерона в отличие от ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента способствует более надежной профилактике рецидивов фибрилляции предсердий.

Эффективность применения препаратов этой группы с целью вторичной профилактики пароксизмов фибрилляции предсердий была подтверждена нашим многофакторным

дискриминантным анализом.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий у больных с артериальной гипертензией, электрическая кардиоверсия, клинико-анамнестические факторы сохранения синусового ритма, медикаментозная терапия, ближайший и отдаленный прогноз.
